

# PRIMEROS AUXILIOS EN ANIMALES DE COMPAÑÍA

*Natalia Cuadrado Ramón.  
Veterinaria Colegiada nº 3035*

El objetivo de la charla se puede resumir en estas tres preguntas:

**¿Es grave? ¿Tengo que salir corriendo?:** Muchas de las “urgencias” que vienen de noche o en festivo, no son en realidad una urgencia; son procesos que pueden esperar al horario de consulta normal.

**¿Puedo hacer algo antes?:** podemos poner alguna medida mientras consultamos o nos acercamos al veterinario para que la situación no empeore?

**¿Se podría haber evitado?:** fundamental, hay accidentes que son totalmente evitables.

## INTOXICACIONES

### 1.- POR MEDICAMENTOS

**Antinflamatorios:** paracetamol, aspirina, ibuprofeno.

Dosis toxica paracetamol: ½ gelocatil en YT de 3 Kg.: necrosis hepática.

### **NO DEJAR MEDICAMENTOS AL ALCANCE!**

### **NO AUTOMEDICAR!!!**

No cuesta nada llamar a nuestro veterinario de confianza para preguntarle antes de administrarle ningún medicamento nuestro al perro!!!

- ✓ **Ingestión accidental:** si no lo hemos dado nosotros, sino que el perro lo ha encontrado y ha “decidido automedicarse”:

Si no han pasado más de 2 horas. Inducir el vómito con agua oxigenada: 1ml de agua oxigenada en 4 ml de agua del grifo templada por cada 10 kg de peso del perro.

### **NO hacer vomitar si:**

El animal no está consciente o está muy deprimido.

Si tiene dificultad para respirar.

Nunca si el animal ha ingerido productos de limpieza.

## 2.- EL CHOCOLATE

Dosis tóxica en el perro:

- ✓ Perro 5 kg: 300 g chocolate con leche, 50 g chocolate negro.
- ✓ Síntomas: vómito, diarrea, inquietud, temblores, convulsiones, coma.
- ✓ Si lo ingiere por accidente <2 horas: vomito.

## 3.- ETILENGLICOL (ANTICONGELANTE DE COCHE)

- ✓ Es dulce!!!!!!; les gusta.
- ✓ Intoxicación muy grave!!!! Produce insuficiencia renal aguda
- ✓ Si lo vemos a tiempo : lo haremos vomitar.
- ✓ Acudir rápidamente al veterinario.

## 4.- JABONES Y DETERGENTES

- ✓ En este caso NUNCA induciremos vomito, sobretodo en suavizantes ropa, desinfectantes y germicidas (podemos provocar una neumonía por aspiración).
- ✓ Síntomas: gastrointestinales (salivación, vómitos, diarreas)
- ✓ Tratamiento:
  - Eliminar el producto de ojos, mucosas y piel mediante lavado con agua.
  - Dar agua o leche vía oral.
  - Si presenta vómitos o diarreas acudir al veterinario.
- MUY GRAVE ALCALIS** (desatascadores químicos).

## 5.- PROCESIONARIA.

- ✓ Cuidado con los cachorros!! : todo se lo tienen que meter en la boca!!
- ✓ Lavar con agua la boca, nariz, lengua...las zonas afectadas sin presión!! Para no clavar mas los pelos de la oruga
- ✓ NO inducir vómito!!
- ✓ Riesgo de reacciones anafilácticas, edema glotis, necrosis lengua y esófago.

## 6.- HERIDAS

- ✓ Si existe hemorragia: hacer compresión manual con un paño.
- ✓ Limpiar con agua oxigenada para evaluar daño, hay heridas poco importantes que pueden llegar a sangrar mucho pareciendo mas graves; sobretodo las heridas en las orejas y las uñas rotas.
- ✓ Vendar con gasas y acudir el veterinario.

## 7.- GOLPE DE CALOR

- ✓ **PREVENCION!!!!!!!!!!** : No dejar al animal encerrado en el coche, ni en una zona donde esté expuesto directamente al sol sin agua!!
- ✓ Sacar inmediatamente al animal de la fuente de calor.
- ✓ Acudir inmediatamente a un veterinario.
- ✓ Si no podemos: enfriar lentamente al animal con agua fría, hasta los 39,4-39,7
- ✓ Mojar cuello, cabeza y abdomen.

## 8.- CONGELACIÓN

- ✓ Partes afectadas: orejas, cola, genitales y almohadillas plantares.
- ✓ Sacar al perro de la fuente de frío.
- ✓ Aplicar compresas calientes en la zona afectada.

- ✓ Sumergir las zonas afectadas en agua caliente (39-40 °C).
- ✓ No frotar las zonas afectadas.
- ✓ Secar y aplicar vendajes de algodón sin compresión.

### **9.-DILATACION-TORSIÓN GASTRICA**

- ✓ RECONOCERLA en su inicio.
- ✓ Síntomas:
  - Después de comer: arcadas no productivas repetidas.
  - Inquietud.
  - Distensión abdominal, sonido timpánico.
  - Hipersalivación.
  - Colapso.

**SALIR CORRIENDO Y AVISAR AL VETERINARIO POR TELEFONO!!!!**

### **10.- VOMITOS\_Y DIARREAS AGUDAS:**

- ✓ Retirar agua y comida del alcance.
- ✓ Cuidado en cachorros!!: se pueden deshidratar muy rápido; el mismo cuadro digestivo es leve en un perro adulto y muy peligroso en un cachorro.
- ✓ Introducir agua progresivamente.
- ✓ Si no deja de vomitar o vuelve a vomitar al empezar a darle agua o alimento. ponerse en contacto con el veterinario.
- ✓ Si vomita heces: muy posible que tenga una obstrucción intestinal.

### **11.- PROLAPSO GLOBO OCULAR**

- ✓ Razas predispuestas: las de ojos saltones: pequines, shitzu. Chihuahua.
- ✓ Traumatismos craneales: atropellos con golpes en la cabeza, patadas, peleas con otro perro.
- ✓ El ojo se sale de la orbita; sin miedo!!!! Muy importante primeros auxilios:
- ✓ Mantener el ojo tapado y húmedo!!!!, acudir de urgencias al veterinario, cuanto mas tiempo pase mas riesgo de lesiones del nervio optico.

### **12.- CONVULSIONES**

- ✓ Cuidado: muerden!!!!
- ✓ Apartar muebles u objetos que puedan herirle.
- ✓ Apartarlo de sitios donde pueda caerse.
- ✓ Colocar trapos, cojines...alrededor para minimizar golpes.
- ✓ MANTENER LA CALMA!!!!: intentar fijaros bien en el ataque: cuanto dura, que posición tenía el perro, cuanto tarda en recuperarse, es información muy valiosa para el veterinario.

### **13.- PARADA CARDIORESPIRATORIA**

- ✓ ¿Realmente seré capaz de reconocerla?
- ✓ Muy difícil ventilación manual (tirar de la lengua)
- ✓ Masaje cardiaco.

### **14.-ATROPELLOS**

- ✓ **PREVENCION!!!!!! POR FAVOR.**
- ✓ Mantener la calma y no poner en riesgo la vida de nadie.
- ✓ Cuidado con las mordeduras!!!! Tienen dolor y miedo.
- ✓ Evaluar las hemorragias externas: compresión y torniquete (apuntar la hora!!)
- ✓ Acudir al veterinario: aunque a veces después de un atropello el animal parece estar normal y no haber sufrido ningún daño, hay lesiones que pueden tardar 24-48 horas en aparecer.

- ✓ Evaluar fracturas muy evidentes: estabilizarlas.
- ✓ Dificultad respiratoria: vía aérea obstruida?
- ✓ NO ESTRESAR AL ANIMAL.
- ✓ Moverlo con cuidado.
- ✓ Avisar a la clínica para que estén preparados.

**EL MEJOR TRATAMIENTO:  
LA PREVENCIÓN**